

# 無痛分娩クリニカルパス

氏名 様

	無痛分娩開始	無痛分娩中	分娩終了時	カテーテル抜去時
観察	適宜体温・血圧・脈拍を測定します 頭痛、吐気、味覚異常、呼吸困難感がないか確認します			
安静	状況により歩行時はスタッフが付き添います			分娩後トイレへ歩行できるまでベット上安静です
食事	無痛分娩開始後の食事は摂ることはできません 水・スポーツ飲料のみ飲む事ができます（お茶・珈琲などはご遠慮ください）			食事を摂ることができます
清潔	身体を拭くことができます			
排泄	分娩進行や麻酔効果の状況により排尿用の管で尿をとります もしくはスタッフが付き添ったうえでトイレに行くことができます			
診察 処置	無痛分娩中は継続してお腹にモニターをつけて 赤ちゃんの状態とお腹のはりを観察します			分娩終了2時間後に硬膜 外チューブを抜きます
	硬膜外チューブを 挿入します			
検査	妊娠34週採血で血小板 12万/ $\mu$ L未満の場合 採血をします			
薬物 療法	点滴をします			
		分娩経過により陣痛促進の ため子宮収縮薬の点滴を 使用します		
説明	麻酔同意書(無痛分娩) 陣痛促進同意書を確認 します			
	PCAポンプの使い方について説明します 陣痛がNRS3以上でPCAボタンを押しましょう NRS:0-10の11段階で表現します 0:痛みがない/10:考えられる最悪の痛みがある			
目標	無痛分娩の説明内容 が理解できる	陣痛がNRS2以下でコントロールされる		
	硬膜外麻酔の副作用を 理解できる			

症状・経過によってはスケジュール通りにならない場合があります。

2014年9月作成(2017年12月13日改訂) 聖隷浜松病院 C5病棟