

婦人科開腹手術(腸管洗浄なし)

バス日数 8日間	適応基準 腹式単純子宮全摘術、筋腫核出術、卵巣嚢腫摘出術、付属器切除術を受ける患者	除外条件	目標
----------	--	------	----

日付		/		/		/		/		/	
ユニット名		/		/		/		/		/	
イベント名		/		/		/		/		/	
入外区分		手術前日		手術日		1病日		2病日		3病日	
								入院		3病日	
										4病日	
										5病日	
										6病日・バス終了日	
クリティカルインディケータ			【手術後】合併症の症状・所見がない(腹腔内出血)	合併症の症状・所見がない(腹腔内出血)	→	合併症の症状・所見がない(腹腔内出血、イレウス)	合併症の症状・所見がない(イレウス)	→	→	検査データに問題がない(採血結果で貧血の進行や炎症反応の増悪がない)	→
アウトカム	患者状態		【手術後】創痛のコントロールができていない	創痛のコントロールができていない	→	イレウスの症状・所見がない	イレウスの症状・所見がない(嘔気・嘔吐、排便)	→	→	→	→
	生活動作		【手術後】腸管麻痺の症状・所見がない	腸管麻痺の症状・所見がない	→	→	→	→	→	→	発熱がない(38.0℃以下)
	知識教育	手術について理解できる									日常生活の注意点について理解できる
	その他	臍処置									
診察記事											
文書管理		ATHセット(産婦)									
処方											
治療	注射		①ソリューゲンF注(500mL/本)(ウイーンF)1瓶 120mL/h	①ソリューゲンF注(500mL/本)(ウイーンF)1瓶 120mL/h		②ソルデム3AG号(500mL/袋)1袋+ハントール100mg 2A 120mL/h	②ソルデム3AG号(500mL/袋)1袋+ハントール100mg 2A 120mL/h				
			③ソリューゲンF注(500mL/本)(ウイーンF)1瓶 120mL/h	③ソリューゲンF注(500mL/本)(ウイーンF)1瓶 120mL/h		④ソルデム3AG号(500mL/袋)1袋 120mL/h	④ソルデム3AG号(500mL/袋)1袋 120mL/h				
			1gセファゾリンナトリウム日医工(1g/V)(P)(セファメジン)1g+生食100mL 100mL/h								
	汎用		●ソリューゲンF注 500mL100mL/h	●ソリューゲンF注 500mL100mL/h							
検査	リハ										
	検査				●採血						血液 他
栄養	朝	●普通食	手術止め	手術止め		●軟素食(主食全粥)	●普通食	●普通食	●普通食	●超音波検査	●超音波検査
	夜	●普通食	手術止め	●五分菜食(主食5分粥)	●普通食(米飯)	●普通食	●普通食	●普通食	●普通食	●普通食	●普通食
栄養指導			手術止め	●五分菜食		●普通食	●普通食	●普通食	●普通食		●普通食
看護状態	安静度	院内フリー	床上安静	床上安静						院内フリー	
	移乗FIM	7.自立	1.全介助	1.全介助						7.自立	
	寝返り	自立	介助	介助						自立	
	起き上がり	自立	禁止指示	禁止指示						自立	
座位保持	自力保持	保持不可	保持不可						自力保持		
排泄方法	トイレ	膀胱留置カテーテル	膀胱留置カテーテル						トイレ		
清潔方法	シャワー浴	全身清拭	全身清拭						シャワー浴		
口腔清潔	自立	全介助	準備						自立		
バイタルサイン	体温	毎日1回	毎日6回	毎日4回	毎日3回	毎日2回	毎日2回	毎日2回	毎日2回	毎日1回	毎日1回
	脈拍	毎日1回	毎日6回	毎日4回	毎日3回	毎日2回	毎日2回	毎日2回	毎日2回	毎日1回	毎日1回
	血圧H	毎日1回	毎日6回	毎日4回	毎日3回	毎日2回	毎日2回	毎日2回	毎日2回	毎日1回	毎日1回
	血圧L	毎日1回	毎日6回	毎日4回	毎日3回	毎日2回	毎日2回	毎日2回	毎日2回	毎日1回	毎日1回
SpO2	毎日1回	毎日6回	毎日4回	毎日3回	毎日2回	毎日2回	毎日2回	毎日2回	毎日1回	毎日1回	
OUT PUT	呼吸数	毎日0回[5回]	毎日0回[5回]	毎日4回[4回]							【運動】体温 毎日0回
	膀胱留置カテーテル量	(mL/日) 毎日0回	(mL/日) 毎日0回	(mL/日) 毎日0回							
看護ケア	観察項目	刺入部の発赤	毎日0回	毎日0回	毎日4回	【運動】排ガス 毎日0回	排ガス 毎日2回	排ガス 毎日1回			
		刺入部の熱感	毎日0回	毎日0回	毎日4回						
		刺入部の圧痛	毎日0回	毎日0回	毎日4回						
		刺入部の腫脹	毎日0回	毎日0回	毎日4回						
		刺入部の膿	毎日0回	毎日0回	毎日4回						
		尿管	毎日0回	毎日0回	毎日4回						
		排便	毎日0回	毎日0回	毎日4回						
		嘔吐	毎日0回	毎日0回	毎日4回						
		創傷	毎日0回	毎日0回	毎日4回						
		創部出血	毎日0回	毎日0回	毎日4回						
ガーゼ汚染	毎日0回	毎日0回	毎日4回								
排ガス	毎日0回	毎日0回	毎日4回								
下肢の感覚	毎日0回	毎日0回	毎日4回								
下肢のしびれ	毎日0回	毎日0回	毎日4回								
Eビ注入持続確認	毎日0回	毎日0回	毎日4回								
尿性状	毎日0回	毎日0回	毎日4回								
腹鳴	毎日0回	毎日0回	毎日4回								
性器出血	毎日0回	毎日0回	毎日4回								
間欠的空気圧迫装置による皮膚トラブル	毎日0回[5回]	毎日0回[5回]	毎日4回[4回]								
間欠的空気圧迫装置による自覚症状	毎日0回[5回]	毎日0回[5回]	毎日4回[4回]								
間欠的空気圧迫装置による皮膚の色調変化	毎日0回[5回]	毎日0回[5回]	毎日4回[4回]								
仙骨の発赤	毎日0回	毎日0回	毎日4回								
踵部の発赤	毎日0回	毎日0回	毎日4回								
スケジュール											
指示コメント			口腔ケア 毎日0回[1回]								
必要時	(術後)高熱時①										
	(術後)3痛日より使用可										
	不眠時①										
	疼痛時①										
	医師指示										
	(術後)吐き気のある時①										
	疼痛時②										
	(術後)吐き気のある時②										
	(術後)飲水開始後 NSAIDs 禁忌時										
	(術後)飲水開始後 (術後)高熱時②										
疼痛時①(術後)飲水開始後											
筋肉痛・関節痛時											
疼痛時①(術後)飲水開始後 NSAIDs禁忌時											