

前立腺全摘出術クリニカルパス

様

病日	入院日	手術当日	手術後1日目	手術後2・3日目	手術後4・5日目	手術後6～8日目(7～8日目で退院)
日付	/	/	/	/ /	/	/ ~ /
観 察	入院時・夕方に検温をします 尿量・色をみます(退院まで) 	手術前・手術後は3時間毎に 検温・尿量・色を測定をします 足の感覚の有無・嘔気の有無 お腹の動き・傷の痛みはないか・イ キミ症状の有無・尿の管の固定・ 漏れの有無・傷の管の量・色、傷 のガーゼに汚れはないかを確認し ます	朝昼夕で検温します 1日3回尿量・色を測定します 		昼夕で検温します 	
						
安 静 度	制限はありません	ベッド上安静です 	回診後歩行できます	制限はありません 		
食 事	低残渣食を提供します 午前手術の方は21時より 飲食ができません 	午後手術の方は朝8時まで飲水 できます 以降は飲食できません	回診後飲水できます 夕方お粥がです	朝から普通食が出ます 水分は1日1000mL以上飲むようにしましょう   		
清 潔	入浴ができます	入浴や体拭きはできません 	体を拭きます・管が抜けた翌日からシャワーに入れます 			
排 泄	尿を袋にためてください	手術後尿の管が入ります				尿の管が抜けたら尿を袋にためてください
診 察 処 置	毎朝医師の回診があります					
	お腹の毛を剃ります お臍の掃除をします	手術前に洗腸します(朝) 血栓予防具をつけます 手術した部分に管が入ります	血栓予防具を外します	手術した部分の管から排 泄されるものの量が減った ら腰の管を抜きます 		膀胱造影後尿の管を抜きます(6～8日目)
検 査	採血があります 	手術後レントゲンがあります	採血・レントゲンがあります 	採血があります 		膀胱造影(/) 採血(7～9日目の間に実施)
薬 物	今まで飲んでいた薬を薬剤師が 確認します アレルギーがないか問診表を 確認します 寝る前に下剤を飲みます 	点滴があります・抗生剤の点滴があります 手術後腰の管から痛み止めが入ります 必要な薬だけ朝内服します (内服する際はお伝えします) 痛み・吐き気・イキミ症状がある ときは教えてください	イキミ症状・痛みがあるときは 教えてください 今まで飲んでいた薬を再開す るか確認してお伝えします			
説 明	手術の開始時間・薬・尿の管 血栓予防具・腰の管・手術した部 分の管が入ることについて説明し ます 必要書類を確認します		尿・傷・腰の管・点滴の 取り扱い方を説明します 手術後の初回歩行、初回飲水 は看護師と一緒にいきます		5日目～7日目 尿取りパットの使用方法 尿量の測定方法・肛門括約筋運動について説明します	
目 標	オリエンテーションの説明内容が 理解できる	床上安静をまもることができる 排尿・排泄に異常がない 痛みがコントロールされている	排尿・排泄に異常がない 歩行ができる 痛みがコントロールされている	排尿に異常がない		排尿に異常がない (吻合部に漏れがなく管が抜去できる) 退院後の注意点が理解できる(7・9日目) 膀胱留置カテーテル抜去後排尿がある

症状・経過によってはスケジュール通りにならない場合があります。

2004年9月作成(2021年2月改訂) パス委員会承認 聖隷浜松病院A4病棟