





		手術後1日目 /	手術後2、3日目 /	手術後4日目 / /	手術後5・6日目 / /	手術後7日目 / (退院)
観察		自由に動けますが走ったり、ベッド上で飛び上がって遊ぶのはやめましょう 抱っこもできます(乳幼児)  				
食事		朝からソフト食がでます	朝より食事がでます(普通食)(ミルクの場合はピジョンを使用して飲みます)	食事がでます(小児食) (ミルクの場合は直母で飲むことができます)		
清潔		体を拭くことができます	沐浴、シャワー、シャンプー、洗面(創部以外)ができます 			
薬物療法	点滴	補液の点滴があります	(食事、水分摂取良好であれば術後2日目以降に点滴の針を抜きます)			
	内服薬	朝のみ抗生剤の点滴があります	補液の点滴があります(術後3日目まで)			
	臨時薬	痛み、吐気、発熱時は薬を使用します				
説明・指導					退院後の生活について用紙を用いて説明します(6日目)	退院日に次回の外来について説明し予約券をお渡しします(必要時内服薬をお渡しします)
目標		(歯磨きが困難な場合はうがいのみで良いです。その場合は食後5分以内のうがい効果的です)			退院後の生活で注意することが分かり、傷が開かないように生活できる	
		食事形態の制限を守り、細口哺乳器またはシリコン製スプーンで食事が摂れる				

症状・経過によってはスケジュール通りにならない場合があります。