

	grade 1	grade 2	grade 3	grade 4
食欲不振	摂食習慣の変化を伴わない食欲低下	顕著な体重減少や栄養失調を伴わない摂食量の変化；経口栄養剤による補充を要する	顕著な体重減少や栄養失調を伴う；静脈内輸液、経管栄養、TPNを要する	生命を脅かす
悪心	摂食習慣に影響のない食欲低下	顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少	カロリーや水分の経口摂取が不十分；経管栄養、TPN、入院を要する	—
嘔吐	治療を要さない	外来での静脈内輸液を要する；内科的治療を要する	経管栄養、TPN、入院を要する	生命を脅かす
便秘	不定期または間欠的な症状；便軟化薬、緩下剤、食事の工夫、浣腸を不定期に使用	緩下薬又は浣腸の定期的使用を要する持続的；身の回り以外の日常生活動作の制限	排便を要する頑固な便秘；身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす
下痢	ベースラインと比べて<4回/日の排便回数の増加	ベースラインと比べて4-6回/日の排便回数の増加；身の回り以外の日常生活動作の制限	ベースラインと比べて7回以上/日の排便回数の増加；身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす
口内炎	症状がない、または軽度の症状；治療を要さない	経口摂取に支障が無い中等度の疼痛又は潰瘍；食事の変更を要する	高度の疼痛；経口摂取に支障がある	生命を脅かす
吃逆	軽度の症状；治療を要さない	中等度の症状；内科的治療を要する；身の回り以外の日常生活動作の制限	高度の症状；睡眠に支障がある；身の回りの日常生活動作の制限	—
咳嗽	軽度の症状；市販の医薬品を要する	中等度の症状；内科的治療を要する；身の回り以外の日常生活動作の制限	高度の症状；身の回りの日常生活動作の制限	—
呼吸困難	中等度の労作に伴う息切れ	極めて軽度の労作に伴う息切れ；身の回り以外の日常生活動作の制限	安静時の息切れ；身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす
手足症候群	疼痛を伴わない軽微な皮膚の変化又は皮膚炎（例；紅斑、浮腫、角質増加）	疼痛を伴う皮膚の変化（例；角質剥離、水疱、出血、亀裂）；身の回り以外の日常生活動作の制限	疼痛を伴う高度の皮膚の変化；身の回りの日常生活動作の制限	—
皮膚症状	症状がない、または軽度の症状；治療を要さない	最小限、局所的、非侵襲的治療を要する；年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限	重症又は医学的に重大であるが直ちに生命を脅かすものではない；入院又は入院期間の延長を要する；身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす
ざ瘡様皮疹	体表面積の<10%を占める紅色丘疹または膿疱でそう痒や圧痛の有無は問わない	体表面積の10-30%を占める紅色丘疹または膿疱でそう痒や圧痛の有無は問わない 体表面積の>30%を占める紅色丘疹または膿疱で軽度の症状の有無は問わない	体表面積の>30%を占める紅色丘疹または膿疱で中等度または高度の症状を伴う	生命を脅かす
爪囲炎	爪襞の浮腫や紅斑；角質の剥脱	局所的な治療を要する；内科的な治療を要する；疼痛を伴う爪襞の浮腫や紅斑；浸出液や爪の分離を伴う；身の回り以外の日常生活動作の制限	外科的処置を要する；身の回りの日常生活動作を要する	—
CIPN	症状がない	中等度の症状；身の回り以外の日常生活動作の制限	高度の症状；身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす
倦怠感	怠さがある、又は元気がない	身の回り以外の日常生活動作を制限する怠さがある、又は元気がない状態	身の回りの日常生活動作を制限する怠さがある、または元気がない状態	—
味覚不全	食生活の変化を伴わない味覚変化	食生活の変化を伴う味覚変化	—	—
高血圧	120-139/80-89	140-159/90-99；単剤の薬物治療を要する	160以上/100以上；2種類以上の薬物治療又は以前よりも強い治療を要する	生命を脅かす
鼻出血	軽度の症状；治療を要さない	中等度の症状；内科的治療を要する（例；鼻タンポン、焼却術、外用血管収縮薬）	輸血を要する；侵襲的治療を要する	生命を脅かす
尿タンパク	蛋白尿1+	尿蛋白2-3+	尿蛋白4+	—

※身の回りの日常生活動作（BADL）；家庭における歩行や移動、食事、更衣、入浴、排泄などの基本的な身体動作

※身の回り以外の日常生活動作（IADL）；買い物、食事の支度、家事、洗濯、服薬管理など自立した生活を営むためのより複雑で多くの労作が求められる活動