

【乳がん】

ddEC (エビルピシン+エンドキサン) (1コース: 14日 4コース)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
エビルピシン	90 mg/m ²	点滴静注30分	d1
エンドキサン	600 mg/m ²	点滴静注60分	d1

EC (エビルピシン+エンドキサン) (1コース: 21日 4コースまで)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
エビルピシン	90 mg/m ²	点滴静注30分	d1
エンドキサン	600 mg/m ²	点滴静注60分	d1

TC (ドセタキセル+エンドキサン) (1コース: 21日 4コースまで)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注 60分	day1
エンドキサン	600 mg/m ²	点滴静注 60分	day1

TcbH 3週ごと 6コース (トラスツマブは1年間継続)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注 60分	day1 (6コースまで)
カルボプラチン	6 AUC	点滴静注 60分	day1 (6コースまで)
トラスツマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注初回90分	day1
トラスツマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注2回目以降30分	day1

TCbH+P (1コース: 21日 標準ドセタキセル、カルボプラチンは4~6コース、トラスツマブ、パージェタは1年間)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
パージェタ (初回)	840 mg/body	点滴静注 60分	day1
パージェタ (2回目以降)	420 mg/body	点滴静注30分(忍容性に応じて)	day1
トラスツマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注90分	day1
トラスツマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注30分(忍容性に応じて)	day1
ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注 60分	day1 (6コースまで)
カルボプラチン	6 AUC	点滴静注 60分	day1 (6コースまで)

パージェタ+トラスツマブ+パクリタキセル (1コース: 21日 標準パクリタキセルは4コース、術後補助療法はトラスツマブ、パージェタは1年間)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
パージェタ (初回)	840 mg/body	点滴静注 60分	day1 (初回)
パージェタ (2回目以降)	420 mg/body	点滴静注 30分 (忍容性に応じて)	day1 (2回目以降)
トラスツマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注 90分	day1 (初回)
トラスツマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 30分 (忍容性に応じて)	day1 (2回目以降)
パクリタキセル (PTX)	80 mg/m ²	点滴静注 60分	day1、8、15

パージェタ+トラスツマブ+ドセタキセル (1コース: 21日 標準ドセタキセルは4コース 術後補助療法はトラスツマブ・パージェタは1年間)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
パージェタ (初回)	840 mg/body	点滴静注 60分	day1 (初回)
パージェタ (2回目以降)	420 mg/body	点滴静注 30分 (忍容性に応じて)	day1 (2回目以降)
トラスツマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注 90分	day1 (初回)
トラスツマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 30分 (忍容性に応じて)	day1 (2回目以降)
ドセタキセル (DTX)	75 mg/m ²	点滴静注 60分	day1

パージェタ+トラスツマブ+アブラキサン (1コース: 21日 標準アブラキサンは4コース、パージェタ・トラスツマブは1年間)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
パージェタ (初回)	840 mg/body	点滴静注 60分	day1 (初回)
パージェタ (2回目以降)	420 mg/body	点滴静注 30分	day1 (2回目以降)
トラスツマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注 90分	day1 (初回)
トラスツマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 30分	day1 (2回目以降)
アブラキサン	125 mg/m ²	点滴静注 60分	day1、8、15

ジェムザール (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ジェムザール	1250 mg/m ²	点滴静注 30分	day1、day8

トラスツマブ+ゼローダ (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
トラスツマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注 初回90分	day1
トラスツマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 2回目以降30分	day1
ゼローダ	下記表参照	内服 1日2回朝夕食後30分以内	day1-14

* $e^{\frac{1}{2}}$ 体表面積1.33m²未満: 1回1500mg、1.33~1.57m²未満: 1回1800mg、1.57-1.81m²未満: 1回2100mg、1.81m²以上: 1回2400mg

カドサイラ (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
カドサイラ	3.6 mg/Kg	点滴静注 90~30分	day1

パクリタキセル+アバスチン (1コース：28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル	90 mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,day8,day15
アバスチン	10 mg/kg	点滴静注 90~30分	day1,day15

アブラキサン毎週 (1コース：28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アブラキサン	100 mg/m ²	点滴静注 30分	day1,day8,day15

wカルボプラチン+wアブラキサン (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アブラキサン	100 mg/m ²	点滴静注 30分	day1,day8
カルボプラチン	2 AUC	点滴静注 60分	day1,day8

wカルボプラチン+wジェムザール(1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	day1,day8
カルボプラチン	2 AUC	点滴静注 60分	day1,day8

wカルボプラチン+wパクリタキセル (1コース：28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 60分	day1,8,15
カルボプラチン	2 AUC	点滴静注 60分	day1,8,15

エンハーツ (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
エンハーツ	5.4 mg/kg	点滴静注 30~90分	day1

テセントリク+アブラキサン (1コース：28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
テセントリク	840 mg/boby	点滴静注 30~60分	day1,15
アブラキサン	100 mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15

Weekly/パクリタキセル (1コース：7日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 60分	day1

トラスツズマブ (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注 初回90分	day1
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 2回目以降30分	day1

ナベルピン (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ナベルピン	25 mg/m ²	点滴静注 10分以内	day1,8

ハラヴェン (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ハラヴェン	1.4 mg/m ²	点滴静注 2~5分	day1,8

トラスツズマブ+ハラヴェン (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注 初回90分	day1
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 2回目以降30分	day1
ハラヴェン	1.4 mg/m ²	点滴静注 2~5分	day1,8

トラスツズマブ+ナベルピン (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注 初回90分	day1
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 2回目以降30分	day1
ナベルピン	25 mg/m ²	点滴静注 10分以内	day1,8

トラスツズマブ+ジェムザール (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注 初回90分	day1
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 2回目以降30分	day1
ジェムザール	1250 mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8

キイトルーダ(3w)+wパクリタキセル(1コース：84日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注 30分	day1,22,43,64
パクリタキセル	90	mg/m ²	点滴静注 60分	day1,8,15,29,36,43,57,64,71

キイトルーダ(6w)+wパクリタキセル(1コース：84日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	400	mg/body	点滴静注 30分	day1,43
パクリタキセル	90	mg/m ²	点滴静注 60分	day1,8,15,29,36,43,57,64,71

キイトルーダ(3w)+wジェムザール+wカルボプラチン(1コース：21日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注 30分	day1
ジェムザール	1000	mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8
カルボプラチン	2	AUC	点滴静注 60分	day1,8

キイトルーダ(6w)+wジェムザール+wカルボプラチン(1コース：42日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	400	mg/body	点滴静注 30分	day1
ジェムザール	1000	mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,22,29
カルボプラチン	2	AUC	点滴静注 60分	day1,8,22,29