

【胃がん】

胃 DS (1~7コース: 21日/1コース、8コース以降: 42日/1コース)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
TS-1 (1コース)	-	内服	day1-day14
ドセタキセル (2~7コース)	40 mg/m ²	点滴静注 90分	day1
TS-1 (2~7コース)	-	内服	day1-day14
TS-1 (8コース以降)	-	内服	day1-day28

* TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5㎡未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

胃 Weeklyパクリタキセル (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 60分	d 1,8,15

胃 サイラムザ (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注 60分	day1

胃 サイラムザ+パクリタキセル (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d 1,15
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 1時間	d 1,8,15

胃 SOX (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ティーエスワンOD錠	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝食後	day1夕-day15朝
エルブラット	100 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1

* TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5㎡未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

胃 XELOX (1コース: 21日) 術後補助療法は8コースまで

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
エルブラット	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
ゼローダ	下記参照	1日2回 内服	d1 PM-d15 AM

* ゼローダ 体表面積1.36㎡未満: 1回1200mg、1.36~1.66㎡未満: 1回1500mg、1.66-1.96㎡未満: 1回1800mg、1.96㎡以上: 1回2100mg

胃 オブジーボ (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ	240 mg/body	点滴静注 30分以上かけて	day1

胃 オブジーボ (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ	480 mg/body	点滴静注 30分以上かけて	day1

胃 トラスツズマブ+SOX (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ティーエスワンOD錠	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝食後	day1夕-day15朝
エルブラット	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注 初回90分	day1
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 2回目以降30分	day1

* TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5㎡未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

胃 サイラムザ+アブラキサン (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d 1,15
アブラキサン	100 mg/m ²	点滴静注 1時間	d 1,8,15

【胆道がん】

胆道 CDDP+GEM (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1, d8
シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注 1時間	d1, d8

胆道 GEM (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d 1,8,15

【膀胱がん】

膀胱 GEM (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d 1,8,15

膀胱 膀胱TS-1+GEM (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
TS-1	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝夕食後	d 1-14
ジェムザール	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d 8, 15

* TS-1 体表面積1.25㎡未満: 60mg/日(朝40mg 夕20mg)、1.25~1.5㎡未満: 80mg/日、1.5㎡以上: 100mg/日

膀胱 オニバイド+FF (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
オニバイド	70 mg/m ²	点滴静注 90分	day1
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	day1-3

膀胱 GEM+nab-PTX (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d 1,8,15
アブラキサン	125 mg/m ²	点滴静注 30分	d 1,8,15

【大腸がん】

大腸 mFOLFOX6±アバスチン (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスチン	5 mg/kg	点滴静注 90~30分	day1
エルブラット	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m ²	点滴静注 15分	day1
5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	day1

大腸 FOLFIRI±アバスチン (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスチン	5 mg/kg	点滴静注 90分~30分	day1
カンプト	150 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m ²	点滴静注 15分	day1
5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	day1

大腸 アバスチン+FOLFOXIRI (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスチン	5 mg/kg	点滴静注 90分~30分	day1
カンプト	150 mg/m ²	点滴静注 1時間	day1 (12コースまで)
エルブラット	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1 (12コースまで)
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	day1

大腸 アバスチン+IRIS (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスチン	5 mg/kg	点滴静注 90~30分	day1.15
カンプト	100 mg/m ²	点滴静注 90分	day1.15
TS-1	別表参照	1日2回 朝夕食後内服	day1夕-day15朝

* TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5㎡未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

大腸 IRIS (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
カンプト	125 mg/m ²	点滴静注 90分	day1.15
TS-1	別表参照	1日2回 朝夕食後内服	day1夕-day15朝

* TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5㎡未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

大腸 アバスチン+SOX (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ティーエスワンOD錠	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝夕食後	day1夕-day15朝
アバスチン	7.5 mg/kg	点滴静注 90~30分	day1
エルブラット	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1

* TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5㎡未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

大腸 ベクティビックス (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注 1時間	day1

大腸 ベクティビックス+mFOLFOX6 (1コース：14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注 1時間	day1
エルブラット	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m ²	点滴静注 15分間	day1
5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	day1

大腸 ベクティビックス+FOLFIRI (1コース：14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注 1時間	day1
カンプト	150 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m ²	点滴静注 15分間	day1
5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	day1

大腸 サイラムザ+FOLFIRI (1コース：14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
サイラムザ (RAM)	8 mg/kg	点滴静注 1時間	day1
カンプト	150 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m ²	点滴静注 15分	day1
5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	day1

大腸 SIRB (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスタチン	7.5 mg/kg	点滴静注 90~30分	day1
カンプト	150 mg/m ²	点滴静注 90分	day1
TS-1	別表参照	1日2回 朝夕食後内服	day1夕-day15朝

* TS-1 体表面積1.25㎡未満：80mg/日、1.25~1.5㎡未満：100mg/日、1.5㎡以上：120mg/日

大腸 SOX (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ティーエスワンOD錠	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝夕食後	day1夕-day15朝
エルブラット	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1

* TS-1 体表面積1.25㎡未満：80mg/日、1.25~1.5㎡未満：100mg/日、1.5㎡以上：120mg/日

大腸 XELOX+アバスタチン (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスタチン	7.5 mg/kg	点滴静注 90~30分	day1
エルブラット	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
ゼロダ	下記参照	1日2回 内服	d1 PM-d15 AM

* ゼロダ 体表面積1.36㎡未満：1回1200mg、1.36~1.66㎡未満：1回1500mg、1.66-1.96㎡未満：1回1800mg、1.96㎡以上：1回2100mg

大腸 XELOX (1コース：21日) 術後補助療法は8コースまたは3コースまで

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
エルブラット	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
ゼロダ	下記参照	1日2回 内服	d1 PM-d15 AM

* ゼロダ 体表面積1.36㎡未満：1回1200mg、1.36~1.66㎡未満：1回1500mg、1.66-1.96㎡未満：1回1800mg、1.96㎡以上：1回2100mg

大腸 カンプト+ベクティビックス (1コース：14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
カンプト	150 mg/m ²	点滴静注 90分	day1
ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注 1時間	day1

大腸 ザルトラップ+FOLFIRI (1コース：14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ザルトラップ	4 mg/kg	点滴静注 1時間	day1
カンプト	150 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m ²	点滴静注 15分間	day1
5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	day1

大腸 XELIRI+アバスタチン(1コース:21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスタチン	7.5 mg/kg	点滴静注 30~90分	day1
カンプト	200 mg/m ²	点滴静注 90分	day1
ゼロダ	下記参照	1日2回 内服	d1 PM-d15 AM

* ゼロダ 体表面積1.31㎡未満：1回900mg、1.31~1.69㎡未満：1回1200mg、1.69-2.07㎡未満：1回1500mg、2.07㎡以上：1回1800mg