


2007年10月作成(2020年 9月改訂)パス委員会承認 聖隷浜松病院 C7病棟

		手術後1日目 ／	手術後2、3日目 ／	手術後4日目 ／ ／	手術後5・6日目 ／ ／	手術後7日目 ／ (退院)
観 察		自由に動けますが走ったり、ベッド上で飛び上がって遊ぶのはやめましょう				
		抱っこもできます(乳幼児)  				
食 事		朝からソフト食がでます	朝より食事がでます(普通食)(ミルクの場合はピジョンを使用して飲みます)	食事がでます(小児食) (ミルクの場合は直母で飲むことができます)		
		脱水予防のために水分を1日に500mL以上摂取しましょう				
		スプーン使用時はシリコン製のものを使い、スプーンは奥に入れないようにしましょう				
清 潔		体を拭くことができます	沐浴、シャワー、シャンプー、洗面(創部以外)ができます 			
薬 物 療 法	点 滴	補液の点滴があります 朝のみ抗生剤の点滴があります	(食事、水分摂取良好であれば術後2日目以降に点滴の針を抜きます) 補液の点滴があります(術後3日目まで)			
	内 服 薬	鎮痛薬を毎食前に飲みましょう(朝、看護師がお渡しします) 毎食後、抗生剤を飲みましょう(術後1日目の夕から開始です。夕、看護師がお渡しします)				
	臨 時 薬	痛み、吐気、発熱時は薬を使用します				
説 明 ・ 指 導					退院後の生活について用紙を用いて説明します(6日目) 	退院日に次回の外来について説明し予約券をお渡しします(必要時内服薬をお渡しします)
目 標		(歯磨きが困難な場合はうがいのみで良いです。その場合は食後5分以内のうがいが効果的です) 食事形態の制限を守り、細口哺乳器またはシリコン製スプーンで食事が摂れる			退院後の生活で注意することが分かり、傷が開かないように生活できる	

症状・経過によってはスケジュール通りにならない場合があります。