


2007年10月作成(2020年 9月改訂)パス委員会承認 聖隷浜松病院 C7病棟

		手術後1日目 ／	手術後2日目 ／	手術後3・4日目 ／ ／	手術後5・6日目 ／ ／	手術後7日目 ／ (退院)	
観察							
		自由に動けますが走ったり、ベッド上で飛び上がって遊ぶのはやめましょう 抱っこもできます(乳幼児)  					
食事		朝から流動食がでます	朝から3分粥がでます	朝から5分粥がでます	朝から7分粥がでます (離乳食の場合は食べていた形態)		
		脱水予防のために水分を1日に500mL以上摂取しましょう スプーン使用時はシリコン製のものを使い、スプーンは奥に入れないようにしましょう					
清潔		体を拭くことができます	沐浴、シャワー、シャンプー、洗面(創部以外)ができます				
薬物療法	点滴	補液の点滴があります(食事、水分摂取良好であれば術後2日目以降に点滴の針を抜きます)					
	内服薬	鎮痛薬を毎食前に飲みましょう(朝、看護師がお渡しします)					
	臨時薬	痛み、吐気、発熱時は薬を使用します					
説明・指導					退院後の生活について用紙を用いて説明します (6日目) 	退院日に次回の外来について説明し予約券をお渡しします (必要時内服薬をお渡しします)	
目標		歯科にかかり、適切な方法で歯磨きができる (歯磨きが困難な場合はうがいのみで良いです。その場合は食後5分以内のうがい効果が効果的です) 食事形態の制限を守り、細口哺乳器またはシリコン製スプーンで食事が摂れる			退院後の生活で注意することが分かり、傷が開かないように生活できる		

症状・経過によってはスケジュール通りにならない場合があります。