| Rp | パス名<br>薬剤名 | 投与量<br>コメント | NAME1 | 投与時間 | 投与日<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CDDP+GEM | | | | | | | | | | | 1サイクル＝21 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ▲▲シスプラチン | 25 mg/㎡ | 点滴静注 | 2　時間かけて | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ▲▲ジェムザール | 1000 mg/㎡ | 点滴静注 | 30　分かけて | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CPT-11 | | | | | | | | | | | 1サイクル＝28 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ▲▲イリノテカン | 60 mg/㎡ | 点滴静注 | 90　分かけて | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | GEM(2投1休) | | | | | | | | | | | 1サイクル＝21 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ▲▲ジェムザール | 1000 mg/㎡ | 点滴静注 | 30　分かけて | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GEM(bi-weekly) | | | | | | | | | | | 1サイクル＝28 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ▲▲ジェムザール | 1000 mg/㎡ | 点滴静注 | 30　分かけて | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | GEM(3投1休) | | | | | | | | | | | 1サイクル＝28 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ▲▲ジェムザール | 1000 mg/㎡ | 点滴静注 | 30　分かけて | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | nabPTX+GEM | | | | | | | | | | | 1サイクル＝28 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ▲▲アブラキサン | 125 mg/㎡ | 点滴静注 | 30　分かけて | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ▲▲ジェムザール | 1000 mg/㎡ | 点滴静注 | 30　分かけて | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |