

大腸肛門科	FOLFIRI(入院)				1サイクル=14日
1	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				イリリカと同時投与	
2	▲▲イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				ベバ 剤と同時に開始	
3	▲▲5-FU	400 mg/m ²	点滴静注	全開で	●
4	▲▲5-FU	1200 mg/m ²	点滴静注	2 3 時間かけて	● ●
大腸肛門科	IRIS				1サイクル=28日
1	▲▲イリノテカン	125 mg/m ²	点滴静注	9 0 分かけて	●
大腸肛門科	IRIS+Beva				1サイクル=28日
1	▲▲アバステン	5 mg/kg	点滴静注		●
				1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	
2	▲▲イリノテカン	125 mg/m ²	点滴静注	9 0 分かけて	●
大腸肛門科	mFOLFOX6(外来)				4 1サイクル=14日
1	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				エル プラットと同時に開始	
2	▲▲エルプラット	85 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				ベバ 剤と同時に開始	
3	▲▲5-FU	400 mg/m ²	点滴静注	全開で	●
4	▲▲5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間かけて	●
大腸肛門科	mFOLFOX6(入院)				1サイクル=14日
1	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				エル プラットと同時に開始	
2	▲▲エルプラット	85 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				ベバ 剤と同時に開始	
3	▲▲5-FU	400 mg/m ²	点滴静注	全開で	●
4	▲▲5-FU	1200 mg/m ²	点滴静注	2 3 時間かけて	● ●
大腸肛門科	Pani+CPT-11				1サイクル=28日
1	▲▲ベクティピックス	6 mg/kg	点滴静注	6 0 分かけて	●
2	▲▲イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	9 0 分かけて	●
大腸肛門科	Pani+FOLFIRI(外来)				1サイクル=14日
1	▲▲ベクティピックス	6 mg/kg	点滴静注	6 0 分かけて	●
2	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				イリリカと同時投与	
3	▲▲イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				ベバ 剤と同時に開始	
4	▲▲5-FU	400 mg/m ²	点滴静注	全開で	●
5	▲▲5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間かけて	●
大腸肛門科	Pani+FOLFIRI(入院)				1サイクル=14日
1	▲▲ベクティピックス	6 mg/kg	点滴静注	6 0 分かけて	●
2	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				イリリカと同時投与	
3	▲▲イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				ベバ 剤と同時に開始	
4	▲▲5-FU	400 mg/m ²	点滴静注	全開で	●
5	▲▲5-FU	1200 mg/m ²	点滴静注	2 3 時間かけて	● ●
大腸肛門科	Pani+mFOLFOX6(外来)				1サイクル=14日
1	▲▲ベクティピックス	6 mg/kg	点滴静注	6 0 分かけて	●
2	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				エル プラットと同時に開始	
3	▲▲エルプラット	85 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				ベバ 剤と同時に開始	
4	▲▲5-FU	400 mg/m ²	点滴静注	全開で	●
5	▲▲5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間かけて	●
大腸肛門科	Pani+mFOLFOX6(入院)				1サイクル=14日
1	▲▲ベクティピックス	6 mg/kg	点滴静注	1 時間かけて	●
2	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				エル プラットと同時に開始	
3	▲▲エルプラット	85 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				ベバ 剤と同時に開始	
4	▲▲5-FU	400 mg/m ²	点滴静注	全開で	●
5	▲▲5-FU	1200 mg/m ²	点滴静注	2 3 時間かけて	● ●
大腸肛門科	Panitumumab				1サイクル=14日
1	▲▲ベクティピックス	6 mg/kg	点滴静注	6 0 分かけて	●
				Panitumumab.pdf	
大腸肛門科	RAM+FOLFIRI(外来)				1サイクル=14日
1	▲▲サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注	6 0 分かけて	●
				1回目:投与後1時間観察、2回目以降:観察省略可	
2	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				イリリカと同時投与	
3	▲▲イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
				ベバ 剤と同時に開始	
4	▲▲5-FU	400 mg/m ²	点滴静注	全開で	●
5	▲▲5-FU	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間かけて	●
				FOLFIRI-RAM.pdf	
大腸肛門科	RAM+FOLFIRI(入院)				1サイクル=14日

