BEP
CBDCA+VP-16(患者限定)
DEC
DIN
DOC+PSL
GC(Carboplatin)
GC(Cisplatin)
GDC
Ipirimumab+Nivolumab
M-VAC
Nivolumab
Pembrolizumab
THP-ADM膀注
TIP
ジェブタナ
トーリセル

Rp	バス名 薬剤名	投与量 コメント	NAME1	投与時間	投与日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
	BEP				1サイクル=21 日
1	▲▲エトポシド	100 mg/㎖	点滴静注	3 時間かけて	● ● ● ● ●
2	▲▲プレオ	20 mg/㎖	点滴静注	1 時間かけて	● ● ●
		最大:30mg/回	生涯投与量:360mgまで		
3	▲▲シスプラチン	20 mg/㎖	点滴静注	3 時間かけて	● ● ● ● ●
	N Engl J Med. 1987;316: 1435-40				
	CBDCA+VP-16(患者限定)				1サイクル=21 日
1	▲▲エトポシド	100 mg/㎖	点滴静注	2 時間かけて	● ● ●
2	▲▲カルボプラチン	ＡＵＣ5	点滴静注	1 時間かけて	●
	DEC				1サイクル=28 日
1	▲▲ドセタキセル	30 mg/㎖	点滴静注	60 分かけて	● ● ● ●
2	▲▲カルボプラチン	ＡＵＣ6	点滴静注	60 分かけて	●
3	▲▲エストラサイト	156.7 mg × 4 錠	1日2回	朝夕食後	day1-28
	DIN				1サイクル=21 日
1	▲▲イホマイド	2 g/㎖	点滴静注	1 時間かけて	● ● ●
2	▲▲アクプラ	100 mg/㎖	点滴静注	2 時間かけて	●
3	▲▲ドセタキセル	75 mg/㎖	点滴静注	2 時間かけて	●
4	ウロミテキサン	400 mg/㎖	点滴静注	15 分かけて	● ● ●
		400 mg/㎖	点滴静注	全開で	● ● ●
		400 mg/㎖	点滴静注	6 時間かけて	● ● ●
	DOC+PSL				1サイクル=21 日
1	▲▲ドセタキセル	75 mg/㎖	点滴静注	1 時間かけて	●
2	プレドニン	10mg/日	1日2回		day1-21
	GC（Carboplatin）				1サイクル=21 日
1	▲▲ジェムザール	1000 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	● ●
2	▲▲カルボプラチン	ＡＵＣ5	点滴静注	1 時間かけて	●
	GC（Cisplatin）				1サイクル=28 日
1	▲▲ジェムザール	1000 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	● ● ●
2	▲▲シスプラチン	70 mg/㎡	点滴静注	3 時間かけて	●
	GDC				1サイクル=21 日
1	▲▲ジェムザール	750 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	● ●
2	▲▲ドセタキセル	50 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	●
3	▲▲カルボプラチン	ＡＵＣ2，2	点滴静注	1 時間かけて	●
	Ipirimumab+Nivolumab				1サイクル=21 日
1	▲▲オプジーボ	240 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて	●
2	▲▲ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30 分かけて	●
	オプジーボ+ヤーボイ.pdf				
	M-VAC				1サイクル=28 日
1	▲▲メソトレキセート	30 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●
2	▲▲エクザール	3 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●
3	▲▲ドキソルビシン	30 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●
4	▲▲シスプラチン	70 mg/㎡	点滴静注	4 時間かけて	●
		1 時間かけて			● ●
5	▲▲エクザール	3 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	● ●
	Nivolumab				1サイクル=14 日
1	▲▲オプジーボ	240 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて	●
	Pembrolizumab				1サイクル=21 日
1	▲▲キイトルーダ	200 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて	●
	THP-ADM膀注				1サイクル=7 日
1	▲▲ピノルビン	20 mg/BODY	膀胱内注射		●
	TIP				1サイクル=21 日
1	▲▲パクリタキセル	175 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●
2	▲▲イホマイド	1 g/㎡	点滴静注	4 時間かけて	● ● ● ● ●
4	▲▲シスプラチン	20 mg/㎡	点滴静注	3 時間かけて	● ● ● ● ●
5	ウロミテキサン	400 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●x2●x2●x2●x3
		ｲﾎﾏｲﾄﾞ 開始0,4,8時間後			
	TIP.pdf				
	TIP2.pdf				
	TIP3.pdf				
	VIP.pdf				
	トーリセル				1サイクル=7 日
1	▲▲トーリセル	25 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて	●
		前投薬：抗ヒスタミン			
	ジェブタナ				1サイクル=21 日
1	▲▲ジェブタナ	25 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	●
		前投薬終了30分後に開始			
2	プレドニン	10mg/日	1日2回		day1-21