

CapeOX	FP(術前)JCOG9907	MTX+5-FU	RAM PTX
CPT-11	5-FU+CBDCA	nabPTX	S-1+DTX
CPT-11+CDDP	HER	Nivolumab	SOX
DTX(胃癌)	HER+PTX	PTX	TS-1+CDDP
DTX(食道癌)	HER+SOX	RAM	

バス名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42										
CapeOX																																																								
1 ▲▲エルブラット	100 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●																																																				
2 ▲▲ゼローダ	2000 mg/m ² /日	1日2回	朝夕食後	day1-14																																																				
CPT-11																																																								
1 ▲▲イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	90 分かけて	●																																																				
CPT-11+CDDP																																																								
1 ▲▲イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	90 分かけて	●																																																				
2 ▲▲シスプラチン	30 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●																																																				
DTX(胃癌)																																																								
1 ▲▲ドセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	●																																																				
DTX(食道癌)																																																								
1 ▲▲ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	●																																																				
FP(術前): JCOG9907																																																								
1 ▲▲5-FU	700 mg/m ²	点滴静注	24 時間かけて	●	●	●	●	●																																																
2 ▲▲シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●																																																				
HER																																																								
1 ▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90 分かけて	●																																																				
	投与前	ロキソプロフェン有無確認																																																						
	(2投目以降) 6 mg/kg		30 分かけて																																																					
HER+SOX																																																								
1 ▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90 分かけて	●																																																				
	投与前	ロキソプロフェン有無確認																																																						
	(2投目以降) 6 mg/kg		30 分かけて																																																					
2 ▲▲エルブラット	100 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●																																																				
3 ▲▲S-1	80 mg/m ² /日	1日2回	朝夕食後	day1-14																																																				
HER+PTX																																																								
1 ▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90 分かけて	●																																																				
	投与前	ロキソプロフェン有無確認																																																						
	(2投目以降) 6 mg/kg		30 分かけて																																																					
2 ▲▲パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	●																																																				
	注: 特-ト, ｶﾞｽﾀ-終了30分後に開始																																																							
nabPTX																																																								
1 ▲▲アブラキサソ	260 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて	●																																																				
Nivolumab																																																								
1 ▲▲オプジーボ	240 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて	●																																																				
MTX+5-FU																																																								
1 ▲▲メソトレキセート	100 mg/m ²	点滴静注	5 分かけて	●																																																				
	翌日昼食後からロイコボリン内服是非確認																																																							
2 ▲▲5-FU	600 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	●																																																				
PTX																																																								
1 ▲▲パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	●																																																				
	注: 特-ト, ｶﾞｽﾀ-終了30分後に開始																																																							
RAM																																																								
1 ▲▲サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	●																																																				
	1回目:投与後1時間観察, 2回目以降:観察省略可																																																							
RAM+PTX																																																								
1 ▲▲サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	●																																																				
	1回目:投与後1時間観察, 2回目以降:観察省略可																																																							
2 ▲▲パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	60 分かけて	●																																																				
	注: 特-ト, ｶﾞｽﾀ-終了30分後に開始																																																							
S-1+DTX																																																								
1 ▲▲ドセタキセル	40 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●																																																				
2 ▲▲S-1	80 mg/m ² /日	1日2回	朝夕食後	day1-14																																																				
	S-1 + D T Xとして2-7サイクル目に適用。他はS-1単剤。																																																							
	S-1+DTX①.pdf																																																							