

ROSEN T-16

ROSEN T-18

ROSEN T-20

エリブリン

バス名	投与量	投与時間	投与日
Rp 薬剤名	コメント	NAME1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ROSEN T-16 高加剤- IFM/VP-16/DXR			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲イホマイド	2 g/m ²	点滴静注	3 時間かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ウロミテキサン	400 mg/m ²	静注	●x3 ●x3 ●x3 ●x3 ●x3
3 ▲▲エトポシド	120 mg/m ²	点滴静注	● ● ● ● ● ● ● ●
4 ▲▲ドキソルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	● ● ● ● ● ● ● ●
/1日/ 120mg/日 14日間内服			
ROSEN T-16 IFM/VP-16/DXR			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲イホマイド	2 g/m ²	点滴静注	3 時間かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ウロミテキサン	400 mg/m ²	静注	●x3 ●x3 ●x3 ●x3 ●x3
3 ▲▲エトポシド	120 mg/m ²	点滴静注	● ● ● ● ● ● ● ●
4 ▲▲ドキソルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	● ● ● ● ● ● ● ●
/1日/ 120mg/日 14日間内服			
ROSEN T-16 CYT			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲エンドキサン	1250 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ▲▲オンコピン	2 mg/BODY	点滴静注	全開で ● ● ● ● ● ● ● ●
ROSEN T-18 高加剤- IFM大量			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲イホマイド	2 g/m ²	点滴静注	3 時間かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ウロミテキサン	400 mg/m ²	静注	●x3 ●x3 ●x3 ●x3 ●x3
ROSEN T-18 高加剤- CDDP(静注)			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲ドキソルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
/1日/ 120mg/日 14日間内服			
2 ▲▲マイトマイシン	10 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
3 ▲▲シスプラチン	120 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
ROSEN T-18 高加剤- CDDP(動注)			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲ドキソルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
/1日/ 120mg/日 14日間内服			
2 ▲▲マイトマイシン	10 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
3 ▲▲シスプラチン	120 mg/m ²	動脈注射	● ● ● ● ● ● ● ●
ROSEN T-18 IFM大量			
1 サイクル=14日			
1 ▲▲イホマイド	2 g/m ²	点滴静注	3 時間かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ウロミテキサン	400 mg/m ²	静注	●x3 ●x3 ●x3 ●x3 ●x3
ROSEN T-18 CDDP(静注)			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲ドキソルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
/1日/ 120mg/日 14日間内服			
2 ▲▲マイトマイシン	10 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
3 ▲▲シスプラチン	120 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
ROSEN T-20 IFM大量療法			
1 サイクル=14日			
1 ▲▲イホマイド	3 g/m ²	点滴静注	3 時間かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ▲▲ペブレオ	20 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
生涯投与量:150mgまで			
3 ウロミテキサン	400 mg/m ²	静注	●x3 ●x3 ●x3 ●x3 ●x3
ROSEN T-20 高加剤- MTX超大量療法			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲オンコピン	2 mg/BODY	静注	● ● ● ● ● ● ● ●
2 ▲▲メソトレキセート	5000 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
3 ▲▲メソトレキセート	5000 mg/m ²	点滴静注	3.5 時間かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
ROSEN T-20 高加剤- IFM大量療法			
1 サイクル=14日			
1 ▲▲イホマイド	3 g/m ²	点滴静注	3 時間かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ▲▲ペブレオ	20 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
生涯投与量:150mgまで			
3 ウロミテキサン	400 mg/m ²	静注	●x3 ●x3 ●x3 ●x3 ●x3
ROSEN T-20 高加剤- CDDP(静注)			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲シスプラチン	120 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ▲▲マイトマイシン	10 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
ROSEN T-20 高加剤- CDDP(動注)			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲シスプラチン	120 mg/m ²	動脈注射	● ● ● ● ● ● ● ●
2 ▲▲マイトマイシン	10 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
ROSEN T-20 Adriamycin(7週目)			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲ドキソルピシン	50 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
ROSEN T-20 Adriamycin(12週目)			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲ドキソルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●
ROSEN T-20 Pirarubicin			
1 サイクル=7日			
1 ▲▲ドキソルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	30 分かけて ● ● ● ● ● ● ● ●

1	▲▲ピノルビン	30 mg/m ²	点滴静注	1 時間かけて	● ●
---	---------	----------------------	------	---------	-----

ROSEN T-20 CDDP(静注)

1サイクル=7 日

1	▲▲シスプラチン	120 mg/m ²	点滴静注	2 時間かけて	●
2	▲▲マイトマイシン	10 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて	●

エリブリン(ハラヴェン)

1サイクル=14 日

1	▲▲ハラヴェン	1.4 mg/m ²	点滴静注	5 分かけて	●
---	---------	-----------------------	------	--------	---