胃癌

- CPT-11
- CPT-11+CDDP
- DTX（胃癌）
- HER
- HER+CapeOX
- HER+SOX
- HER+PTX
- MTX+5-FU
- nabPTX
- Nivolumab
- PTX(3投1休)
- RAM
- RAM+nabPTX
- RAM+PTX
- S-1+DTX
- TS-1+CDDP
- weekly nabPTX
- CapeOX
- SOX

食道癌

- DTX（食道癌）
- FP(術前)JCOG9907
- FP(非切除)JCOG0909
- 5-FU+CBDCA(非切除)JCOG0909

膵／胆道癌

- CDDP+GEM
- GEM
- GEM+S-1
- nabPTX+GEM
- FOLFIRINOX

大腸癌

- 5-FU肝動注
- Beva_2週毎
- Beva+CapeOX
- Beva+FOLFIRI
- Beva+mFOLFOX6
- Beva+SOX
- Cetu+CPT-11
- Cetu+FOLFIRI
- Cetu+mFOLFOX6
- Cetuximab
- FOLFIRI
- IRIS
- mFOLFOX6
- Pani+CPT-11
- Pani+FOLFIRI
- Pani+mFOLFOX6
- Panitumumab
- RAM+FOLFIRI

神経内分泌腫瘍

- CBDCA+VP-16
- CDDP+CPT-11
- CDDP+VP-16
- DTIC
- STZ+5-FU
- STZ+5-FU連続
- STZ(毎週投与)

肝細胞癌

- TACE

Rp	パス名 / 薬剤名	投与量 / コメント	NAME1	投与時間	投与日 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Beva(2週毎)											1サイクル＝14 日																																		
1	▲▲アバスチン	5 mg/kg 1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	点滴静注		●																																									
	【患者限定】Beva単剤(3週毎)											1サイクル＝21 日																																		
1	▲▲アバスチン	15 mg/kg 1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	点滴静注		●																																									
	Beva+CapeOX											1サイクル＝21 日																																		
1	▲▲アバスチン	7.5 mg/kg 1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	点滴静注		●																																									
2	▲▲エルプラット	130 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
3	▲▲ゼローダ	2000 mg/㎡/日 1日2回		朝夕食後	day1-14																																									
	Beva+FOLFIRI											1サイクル＝14 日																																		
1	▲▲アバスチン	5 mg/kg 1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	点滴静注		●																																									
2	レボホリナート	200 mg/㎡ ｲﾘﾉﾃｶﾝと同時投与	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
3	▲▲イリノテカン	150 mg/㎡ ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に開始	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
4	▲▲5-FU	400 mg/㎡	点滴静注	全開で	●																																									
5	▲▲5-FU	2400 mg/㎡ 入院は1200mg/㎡ x 2日間に分割投与する	点滴静注	46 時間かけて	●																																									
	Beva+mFOLFOX6											1サイクル＝14 日																																		
1	▲▲アバスチン	5 mg/kg 1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	点滴静注		●																																									
2	レボホリナート	200 mg/㎡ ｲﾘﾉﾃｶﾝと同時投与	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
3	▲▲エルプラット	85 mg/㎡ ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に開始	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
4	▲▲5-FU	400 mg/㎡	点滴静注	全開で	●																																									
5	▲▲5-FU	2400 mg/㎡ 入院は1200mg/㎡ x 2日間に分割投与する	点滴静注	46 時間かけて	●																																									
	Beva+SOX											1サイクル＝21 日																																		
1	▲▲アバスチン	7.5 mg/kg 1回目90分、2回目60分、3回目以降30分かけて	点滴静注		●																																									
2	▲▲エルプラット	130 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
3	▲▲S-1	80 mg/㎡/日 1日2回		朝夕食後	day1-14																																									
	CBDCA+VP-16											1サイクル＝21 日																																		
1	▲▲カルボプラチン	ＡＵＣ5	点滴静注	1 時間かけて	●																																									
2	▲▲エトポシド	100 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●	●	●																																							
	CDDP+VP-16(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)											1サイクル＝21 日																																		
1	▲▲シスプラチン	80 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	●																																									
2	▲▲エトポシド	100 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●	●	●																																							
	Cetuximab											1サイクル＝7 日																																		
1	▲▲アービタックス	400 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
	(2投目以降)	250 mg/㎡		1 時間かけて																																										
	Cetu.pdf																																													
	Cetu+CPT-11											1サイクル＝28 日																																		
1	▲▲アービタックス	400 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●							●							●							●																				
	(2投目以降)	250 mg/㎡		1 時間かけて																																										
2	▲▲イリノテカン	150 mg/㎡	点滴静注	90 分かけて	●														●																												
	Cetu vs Cetu+CPT.pdf																																													
	Cetu+CPT-11.pdf																																													
	Cetu+FOLFIRI											1サイクル＝14 日																																		
1	▲▲アービタックス	400 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●							●																																		
	(2投目以降)	250 mg/㎡		1 時間かけて																																										
2	レボホリナート	200 mg/㎡ ｲﾘﾉﾃｶﾝと同時投与	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
3	▲▲イリノテカン	150 mg/㎡ ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に開始	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
4	▲▲5-FU	400 mg/㎡	点滴静注	全開で	●																																									
5	▲▲5-FU	2400 mg/㎡ 入院は1200mg/㎡ x 2日間に分割投与する	点滴静注	46 時間かけて	●																																									
	Cetuximab+FOLFIRI.pdf																																													
	Cetu+mFOLFOX6											1サイクル＝14 日																																		
1	▲▲アービタックス	400 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●							●																																		
	(2投目以降)	250 mg/㎡		1 時間かけて																																										
2	レボホリナート	200 mg/㎡ ｴﾙﾌﾞﾗｯﾄと同時に開始	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
3	▲▲エルプラット	85 mg/㎡ ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に開始	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
4	▲▲5-FU	400 mg/㎡	点滴静注	全開で	●																																									
5	▲▲5-FU	2400 mg/㎡ 入院は1200mg/㎡ x 2日間に分割投与する	点滴静注	46 時間かけて	●																																									
	CapeOX											1サイクル＝21 日																																		
1	▲▲エルプラット	130 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●																																									
2	▲▲ゼローダ	2000 mg/㎡/日 1日2回		朝夕食後	day1-14																																									
	CDDP+CPT-11（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)											1サイクル＝28 日																																		
1	▲▲イリノテカン	60 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	●							●							●																												
2	▲▲シスプラチン	60 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	●																																									
	CDDP+GEM(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)											1サイクル＝21 日																																		
1	▲▲シスプラチン	25 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●							●																																		
2	▲▲ジェムザール	1000 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●							●																																		

CPT-11					1サイクル＝28 日		
1	▲▲イリノテカン	60 mg/㎡	点滴静注	90 分かけて	●	●	●

CPT-11+CDDP(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)					1サイクル＝28 日		
1	▲▲イリノテカン	60 mg/㎡	点滴静注	90 分かけて	●		●
2	▲▲シスプラチン	30 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●		●

DTIC					1サイクル＝28 日
1	▲▲ダカルバジン	100 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	● ● ● ● ●

DTX(胃癌)					1サイクル＝21 日
1	▲▲ドセタキセル	60 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	●

DTX(食道癌)					1サイクル＝21 日
1	▲▲ドセタキセル	70 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	●

FOLFIRI					1サイクル＝14 日
1	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●
		ｲﾘﾉﾃｶﾝと同時投与			
2	▲▲イリノテカン	150 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●
		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に開始			
3	▲▲5-FU	400 mg/㎡	点滴静注	全開で	●
4	▲▲5-FU	2400 mg/㎡	点滴静注	46 時間かけて	●
		入院は1200mg/㎡ x 2日間に分割投与する			

FOLFIRINOX(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)					1サイクル＝14 日
1	▲▲エルプラット	85 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●
2	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●
3	▲▲イリノテカン	150 mg/㎡	点滴静注	90 分かけて	●
		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ開始30分後より同時投与			
4	▲▲5-FU	2400 mg/㎡	点滴静注	46 時間かけて	●
		入院は1200mg/㎡ x 2日間に分割投与する			

FP(術前)；JCOG9907(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)					1サイクル＝21 日
1	▲▲5-FU	700 mg/㎡	点滴静注	24 時間かけて	● ● ● ● ●
2	▲▲シスプラチン	70 mg/㎡	点滴静注	2時間かけて	●

FP(非切除)；JCOG0909(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)					1サイクル＝28 日
1	▲▲5-FU	1000 mg/㎡	点滴静注	24 時間かけて	● ● ● ●
2	▲▲シスプラチン	75 mg/㎡	点滴静注	2，5時間かけて	●

5-FU+CBDCA(非切除)；JCOG0909					1サイクル＝28 日
1	▲▲5-FU	1000 mg/㎡	点滴静注	24 時間かけて	● ● ● ●
2	▲▲カルボプラチン	ＡＵＣ5	点滴静注	1 時間かけて	●

食道癌JCOG0909.pdf

GEM					1サイクル＝28 日		
1	▲▲ジェムザール	1000 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●	●	●

GEM(2週毎投与)					1サイクル＝28 日		
1	▲▲ジェムザール	1000 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●		●

GEM+S-1					1サイクル＝21 日
1	▲▲ジェムザール	1000 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	● ●
2	▲▲S-1	80 mg/㎡/日	1日2回	朝夕食後	day1-14

GEM+S-1.pdf

HER					1サイクル＝21 日
1	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90 分かけて	●
		投与前　ロキソプロフェン有無確認			
	(2投目以降)	6 mg/kg	点滴静注	30 分かけて	

HER+CapeOX					1サイクル＝21 日
1	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90 分かけて	●
		投与前　ロキソプロフェン有無確認			
	(2投目以降)	6 mg/kg	点滴静注	30 分かけて	
2	▲▲エルプラット	100 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●
3	▲▲ゼローダ	1000 mg/㎡/日	1日2回	朝夕食後	day1-14

HER+CapeOX.pdf

HER+SOX					1サイクル＝21 日
1	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90 分かけて	●
		投与前　ロキソプロフェン有無確認			
	(2投目以降)	6 mg/kg	点滴静注	30 分かけて	
2	▲▲エルプラット	100 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●
3	▲▲S-1	80 mg/㎡/日	1日2回	朝夕食後	day1-14

HER+PTX					1サイクル＝21 日	
1	▲▲ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90 分かけて	●	
		投与前　ロキソプロフェン有無確認				
	(2投目以降)	6 mg/kg	点滴静注	30 分かけて		
2	▲▲パクリタキセル	100 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	●	●
		ﾃﾞｷｻｰﾄ、ｶﾞｽﾀｰ終了30分後に開始				

IRIS					1サイクル＝28 日		
1	▲▲イリノテカン	125 mg/㎡	点滴静注	90 分かけて	●		●
2	▲▲S-1	80 mg/㎡/日	1日2回	朝夕食後	day1-14		

MTX+5-FU					1サイクル＝7 日
1	▲▲メソトレキセート	100 mg/㎡	点滴静注	5 分かけて	●
		翌日昼食後からロイコボリン内服是非確認			
2	▲▲5-FU	600 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	●

mFOLFOX6					1サイクル＝14 日
1	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●
		ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄと同時に開始			
2	▲▲エルプラット	85 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●
		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に開始			
3	▲▲5-FU	400 mg/㎡	点滴静注	全開で	●
4	▲▲5-FU	2400 mg/㎡	点滴静注	46 時間かけて	●
		入院は1200mg/㎡ x 2日間に分割投与する			

nabPTX					1サイクル＝21 日
1	▲▲アブラキサン	260 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●

nabPTX+GEM					1サイクル＝28 日		
1	▲▲アブラキサン	125 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●	●	●
2	▲▲ジェムザール	1000 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●	●	●

nab-PTX+GEM.pdf

Nivolumab　1サイクル＝14 日

1	▲▲オプジーボ	240 mg/BODY	点滴静注	30 分かけて	●	

RAM　1サイクル＝14 日

1	▲▲サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	●	
		1回目:投与後1時間観察、2回目以降:観察省略可				

RAM+FOLFIRI　1サイクル＝14 日

1	▲▲サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	●	
		1回目:投与後1時間観察、2回目以降:観察省略可				
2	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●	
		ｲﾘﾉﾃｶﾝと同時投与				
3	▲▲イリノテカン	150 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●	
		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に開始				
4	▲▲5-FU	400 mg/㎡	点滴静注	全開で	●	
5	▲▲5-FU	2400 mg/㎡	点滴静注	46 時間かけて	●	
		入院は1200mg/㎡ x 2日間に分割投与する				

RAM+nabPTX　1サイクル＝28 日

1	▲▲サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	●		●
		1回目:投与後1時間観察、2回目以降:観察省略可					
2	▲▲アブラキサン	100 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●	●	●

nabPTX+RAM.pdf

RAM+PTX　1サイクル＝28 日

1	▲▲サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	●		●
		1回目:投与後1時間観察、2回目以降:観察省略可					
2	▲▲パクリタキセル	80 mg/㎡	点滴静注	60 分かけて	●	●	●
		ﾃﾞｷｻｰﾄ､ｶﾞｽﾀｰ終了30分後に開始					

RAM+PTX.pdf

Panitumumab　1サイクル＝14 日

1	▲▲ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	●	

Pani+CPT-11　1サイクル＝28 日

1	▲▲ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	●		●
2	▲▲イリノテカン	150 mg/㎡	点滴静注	90 分かけて	●		●

Pani+FOLFIRI　1サイクル＝14 日

1	▲▲ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	●	
2	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●	
		ｲﾘﾉﾃｶﾝと同時投与				
3	▲▲イリノテカン	150 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●	
		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に開始				
4	▲▲5-FU	400 mg/㎡	点滴静注	全開で	●	
5	▲▲5-FU	2400 mg/㎡	点滴静注	46 時間かけて	●	
		入院は1200mg/㎡ x 2日間に分割投与する				

Pani+mFOLFOX6　1サイクル＝14 日

1	▲▲ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	60 分かけて	●	
2	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●	
		ｴﾙﾌﾞﾗｯﾄと同時に開始				
3	▲▲エルプラット	85 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●	
		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に開始				
4	▲▲5-FU	400 mg/㎡	点滴静注	全開で	●	
5	▲▲5-FU	2400 mg/㎡	点滴静注	46 時間かけて	●	
		入院は1200mg/㎡ x 2日間に分割投与する				

PTX(3投1休)　1サイクル＝28 日

1	▲▲パクリタキセル	80 mg/㎡	点滴静注	1 時間かけて	●	●	●
		ﾃﾞｷｻｰﾄ､ｶﾞｽﾀｰ終了30分後に開始					

S-1+DTX　1サイクル＝21 日

1	▲▲ドセタキセル	40 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●	
2	▲▲S-1	80 mg/㎡/日	1日2回	朝夕食後	day1-14	

Ｓ－１＋ＤＴＸとして２～７サイクル目に適用。他はＳ－１単剤。

S-1+DTX①.pdf

S-1+DTX②.pdf

SOX　1サイクル＝21 日

1	▲▲エルプラット	130 mg/㎡	点滴静注	2 時間かけて	●	
2	▲▲S-1	80 mg/㎡/日	1日2回	朝夕食後	day1-14	

STZ(5日間連続)(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)　1サイクル＝42 日

1	▲▲ザノサー	500 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	● ● ● ● ●	

Streptozocin.pdf

STZ(毎週投与)(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)　1サイクル＝7 日

1	▲▲ザノサー	1000 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●	

STZ+5-FU(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)　1サイクル＝42 日

1	▲▲ザノサー	500 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	● ● ● ● ●	
2	▲▲5-FU	500 mg/㎡	点滴静注	24 時間かけて	● ● ● ● ●	

STZ+5-FU.pdf

TACE(アイエーコール)　1サイクル＝28 日

1	▲▲シスプラチン	50 mg/BODY	動脈注射		●	

TACE(エピルビシン)　1サイクル＝28 日

1	▲▲エピルビシン	50 mg/BODY	動脈注射		●	

TACE(マイトマイシン)　1サイクル＝28 日

1	▲▲マイトマイシン	10 mg/BODY	動脈注射		●	

TACE(ミリプラチン)　1サイクル＝28 日

1	▲▲ミリプラ	140 mg/BODY	動脈注射		●	

ﾐﾘﾌﾟﾗﾁﾝ.pdf

TS-1+CDDP(ｲﾒﾝﾄﾞ併用)　1サイクル＝35 日

1	▲▲シスプラチン	60 mg/㎡	点滴静注	2，5時間かけて		●
2	▲▲S-1	80 mg/㎡/日	1日2回	朝夕食後	day1-21	

weekly nabPTX　1サイクル＝28 日

1	▲▲アブラキサン	100 mg/㎡	点滴静注	30 分かけて	●	●	●

5-FU肝動注　1サイクル＝7 日

1	▲▲5-FU	500 mg/BODY	動脈注射		● ● ● ● ●	