

カテーテル左心耳閉鎖術適応チェックシート

以下の3つの□にチェックが入れば、適応の可能性あります

はい いいえ

① ☐ ☐ 非弁膜症性心房細動の患者さん

② ☐ ☐ 脳卒中リスクの高い患者さん

=CHADS₂ スコア1点以上

C 心不全/ H 高血圧(治療中も含む)/A 75歳以上

D 糖尿病/S 脳卒中・TIAの既往

③ ☐ ☐ いずれか**1つ以上の○**に該当する

○ 出血歴あり、輸血したことがある

○ 出血歴あり、Hb3g/dl以上低下したことがある

○ 出血歴あり、頭蓋内出血であった

○ 高出血リスクである(下記の△に**3つ以上**該当する)

=HAS-BLEDスコアが3点以上

△H 収縮期血圧 >160mmHg

△A 腎障害(Cre>2.26mg/dl・透析・腎移植)

△A 肝障害(正常上限に対しビリルビン2倍・肝酵素3倍)

△S 脳卒中(脳梗塞・脳出血)

△B 出血歴・貧血・皮下出血・血小板減少(5万程度)

△L INRコントロール不良

△E 高齢>65歳

△D 抗血小板薬・鎮痛薬(NSAIDSs)の使用

△D アルコール(毎日ビール500ml or 日本酒1合以上)

左心耳閉鎖術なら抗凝固療法を中止して、出血リスクを抑えながら脳梗塞予防に期待できます

不整脈外来へ
相談ください

