

带状疱疹って
どんな人になるのかな？

带状疱疹って
予防できるのかしら？

50歳を過ぎたら **带状疱疹**の
たい じょう ほう しん
予防接種ができます。

日本人成人の90%以上は、
带状疱疹の原因となるウイルスが
体内に潜んでいて¹⁾、
80歳までに約3人に1人が
带状疱疹になるといわれています²⁾。

带状疱疹について
詳しくはこちらへ
「带状疱疹予防.jp」



URL :
<https://taijouhoushin-yobou.jp>

1) 国立感染症研究所:病原微生物検出情報(IASR)。「水痘抗体保有状況」
[<https://www.niid.go.jp/niid/ja/y-graphs/8132-varicella-yosoku-serum2017.html>], 2021年10月13日確認

2) Shiraki K. et al.: Open Forum Infect Dis. 4(1), ofx007, 2017


【編集協力】愛知医科大学 皮膚科学講座 教授 渡辺大輔 先生

带状疱疹の予防接種をご希望の方はドック・健診室へお問い合わせ下さい

シングリックス筋注用は、 50歳以上が対象の帯状疱疹を予防するためのワクチンです

【予約・お問い合わせ】
ドック・健診室
TEL 045-715-3158
平日10:00~11:00、13:00~16:00


シングリックスの効果



1) Lal H. et al.: N Engl J Med. 372(22), 2087-2096, 2015
2) Cunningham AL. et al.: N Engl J Med. 375(11), 1019-1032, 2016

シングリックスの接種について

筋肉内に注射します。
シングリックスは、2回の接種が必要です。



※例:1回目の接種が10月10日の場合、12月9日から2回目の接種が可能

シングリックスの安全性

多くの方に注射部位の痛みや腫れがあらわれますが、これは、体内で強い免疫をつくらうとする仕組みが働くためと考えられます。

■ シングリックス接種後7日間に起こった主な副反応

注射した部位	痛み [78%]	赤み [38%]	腫れ [26%]
注射部位以外	筋肉痛 [40%]	疲労 [39%]	頭痛 [33%]
	悪寒 [24%]	発熱 [18%]	胃腸症状 [13%]

[]内は副反応が起こった人の割合

承認時評価資料: 国際共同第Ⅲ相臨床試験, ZOSTER-006/022併合解析

副反応の多くは3日以内で治まりますが、気になる症状があれば、医師にご相談ください。

次の方は予防接種を受けることができません

- 明らかに発熱(37.5℃以上)している方
- 重い急性疾患にかかっていることが明らかの方
- 過去にこのワクチンの成分によってアナフィラキシー*を起こしたことがある方
- その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方

*通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんを伴う重いアレルギー反応のこと

接種後は、以下の点に注意が必要です

- ① 接種後30分程度は、接種した施設で安静にしましょう。体調の変化がないことを確認してから帰宅しましょう。
- ② 接種当日は激しい運動を避け、注射部位を清潔に保ってください。接種当日の入浴はさしつかえありません。
- ③ 注射部位の異常な反応や体調の変化を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。