

【乳がん】

ddEC (エピルピシン+エンドキサン) (1コース: 14日 4コース)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
エピルピシン	90	mg/m ²	点滴静注30分	d1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注60分	d1

EC (エピルピシン+エンドキサン) (1コース: 21日 4コースまで)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
エピルピシン	90	mg/m ²	点滴静注30分	d1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注60分	d1

TC (ドセタキセル+エンドキサン) (1コース: 21日 4コースまで)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注 60分	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注 60分	day1

TcbH 3週ごと 6コース (トラスツマブは1年間継続)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注 60分	day1 (6コースまで)
カルボプラチン	6	AUC	点滴静注 60分	day1 (6コースまで)
トラスツマブ (初回)	8	mg/kg	点滴静注初回90分	day1
トラスツマブ (2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注2回目以降30分	day1

TCbH+P (1コース: 21日 標準ドセタキセル、カルボプラチンは4~6コース、トラスツマブ、パージェタは1年間)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
パージェタ (初回)	840	mg/body	点滴静注 60分	day1
パージェタ (2回目以降)	420	mg/body	点滴静注30分 (忍容性に応じて)	day1
トラスツマブ (初回)	8	mg/kg	点滴静注90分	day1
トラスツマブ (2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注30分 (忍容性に応じて)	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注 60分	day1 (6コースまで)
カルボプラチン	6	AUC	点滴静注 60分	day1 (6コースまで)

パージェタ+トラスツマブ+パクリタキセル (1コース: 21日 標準パクリタキセルは4コース、術後補助療法はトラスツマブ、パージェタは1年間)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
パージェタ (初回)	840	mg/body	点滴静注 60分	day1 (初回)
パージェタ (2回目以降)	420	mg/body	点滴静注 30分 (忍容性に応じて)	day1 (2回目以降)
トラスツマブ (初回)	8	mg/kg	点滴静注 90分	day1 (初回)
トラスツマブ (2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注 30分 (忍容性に応じて)	day1 (2回目以降)
パクリタキセル (PTX)	80	mg/m ²	点滴静注 60分	day1、8、15

パージェタ+トラスツマブ+ドセタキセル (1コース: 21日 標準ドセタキセルは4コース 術後補助療法はトラスツマブ・パージェタは1年間)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
パージェタ (初回)	840	mg/body	点滴静注 60分	day1 (初回)
パージェタ (2回目以降)	420	mg/body	点滴静注 30分 (忍容性に応じて)	day1 (2回目以降)
トラスツマブ (初回)	8	mg/kg	点滴静注 90分	day1 (初回)
トラスツマブ (2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注 30分 (忍容性に応じて)	day1 (2回目以降)
ドセタキセル (DTX)	75	mg/m ²	点滴静注 60分	day1

パージェタ+トラスツマブ+アブラキサン (1コース: 21日 標準アブラキサンは4コース、パージェタ・トラスツマブは1年間)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
パージェタ (初回)	840	mg/body	点滴静注 60分	day1 (初回)
パージェタ (2回目以降)	420	mg/body	点滴静注 30分	day1 (2回目以降)
トラスツマブ (初回)	8	mg/kg	点滴静注 90分	day1 (初回)
トラスツマブ (2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注 30分	day1 (2回目以降)
アブラキサン	125	mg/m ²	点滴静注 60分	day1、8、15

ジェムザール (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ジェムザール	1250	mg/m ²	点滴静注 30分	day1、day8

トラスツマブ+ゼローダ (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
トラスツマブ (初回)	8	mg/kg	点滴静注 初回90分	day1
トラスツマブ (2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注 2回目以降30分	day1
ゼローダ	下記参照		内服 1日2回朝夕食後30分以内	day1-14

*ゼローダ体表面積1.33m²未満: 1回1500mg、1.33~1.57m²未満: 1回1800mg、1.57-1.81m²未満: 1回2100mg、1.81m²以上: 1回2400mg

カドサイラ (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
カドサイラ	3.6 mg/Kg		点滴静注 90～30分	day1

パクリタキセル+アバスチン（1コース：28日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
パクリタキセル	90 mg/m ²		点滴静注 1時間	day1,day8,day15
アバスチン	10 mg/kg		点滴静注 90～30分	day1,day15

アブラキサン毎週（1コース：28日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
アブラキサン	100 mg/m ²		点滴静注 30分	day1,day8,day15

wカルボプラチン+wアブラキサン（1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
アブラキサン	100 mg/m ²		点滴静注 30分	day1,day8
カルボプラチン	2 AUC		点滴静注 60分	day1,day8

wカルボプラチン+wジェムザール(1コース：21日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m ²		点滴静注 30分	day1,day8
カルボプラチン	2 AUC		点滴静注 60分	day1,day8

wカルボプラチン+wパクリタキセル（1コース：28日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
パクリタキセル	80 mg/m ²		点滴静注 60分	day1,8,15
カルボプラチン	2 AUC		点滴静注 60分	day1,8,15

エンハーツ（1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
エンハーツ	5.4 mg/kg		点滴静注 30～90分	day1

テセントリク+アブラキサン（1コース：28日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
テセントリク	840 mg/boby		点滴静注 30～60分	day1,15
アブラキサン	100 mg/m ²		点滴静注 30分	day1,8,15

Weeklyパクリタキセル（1コース：7日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
パクリタキセル	80 mg/m ²		点滴静注 60分	day1

トラスツズマブ（1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg		点滴静注 初回90分	day1
トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg		点滴静注 2回目以降30分	day1

ロゼウス（1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ロゼウス	25 mg/m ²		点滴静注 10分以内	day1,8

ハラヴェン（1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ハラヴェン	1.4 mg/m ²		点滴静注 2～5分	day1,8

トラスツズマブ+ハラヴェン（1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg		点滴静注 初回90分	day1
トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg		点滴静注 2回目以降30分	day1
ハラヴェン	1.4 mg/m ²		点滴静注 2～5分	day1,8

トラスツズマブ+ロゼウス（1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg		点滴静注 初回90分	day1
トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg		点滴静注 2回目以降30分	day1
ロゼウス	25 mg/m ²		点滴静注 10分以内	day1,8

トラスツズマブ+ジェムザール（1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg		点滴静注 初回90分	day1

トラスツマブ (2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注 2回目以降30分	day1
ジェムザール	1250	mg/m2	点滴静注 30分	day1,8

キイトルーダ(3w)+wパクリタキセル(1コース：84日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注 30分	day1,22,43,64
パクリタキセル	90	mg/m2	点滴静注 60分	day1,8,15,29,36,43,57,64,71

キイトルーダ(6w)+wパクリタキセル(1コース：84日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	400	mg/body	点滴静注 30分	day1,43
パクリタキセル	90	mg/m2	点滴静注 60分	day1,8,15,29,36,43,57,64,71

キイトルーダ(3w)+wジェムザール+wカルボプラチン(1コース：21日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注 30分	day1
ジェムザール	1000	mg/m2	点滴静注 30分	day1,8
カルボプラチン	2	AUC	点滴静注 60分	day1,8

キイトルーダ(6w)+wジェムザール+wカルボプラチン(1コース：42日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	400	mg/body	点滴静注 30分	day1
ジェムザール	1000	mg/m2	点滴静注 30分	day1,8,22,29
カルボプラチン	2	AUC	点滴静注 60分	day1,8,22,29

キイトルーダ(3w)+wジェムザール+wカルボプラチン 術前①(1コース：21日×4コース)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注 30分	day1
ジェムザール	80	mg/m2	点滴静注 60分	day1,8,15
カルボプラチン	1.5	AUC	点滴静注 60分	day1,8,15

キイトルーダ(3w)+EC 術前②(1コース：21日×4コース)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注 30分	day1
エビルピシン	90	mg/m2	点滴静注 30分	day1
エンドキサシ	600	mg/m2	点滴静注 60分	day1

キイトルーダ 3週毎 (1コース：21日)

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注 30分	day1

バージェタ+トラスツマブ+ゼローダ(1コース：21日)

バージェタ (初回)	840	mg/body	点滴静注 60分	day1 (初回)
バージェタ (2回目以降)	420	mg/body	点滴静注 30分	day1 (2回目以降)
トラスツマブ (初回)	8	mg/kg	点滴静注 90分	day1 (初回)
トラスツマブ (2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注 30分	day1 (2回目以降)
ゼローダ	下記参照		内服 1日2回朝夕食後30分以内	day1-14

*ゼローダ 体表面積1.36㎡未満：1回1200mg、1.36~1.66㎡未満：1回1500mg、1.66-1.96㎡未満：1回1800mg、1.96㎡以上：1回2100mg