

【小細胞肺がん】

カルボプラチン+ラステッド（小細胞肺がん：1コース 21日または28日 4~6コース）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
CBDCA(カルボプラチン)	AUC5		点滴60分	day1
V P-16(ラステッド)	80 mg/m2		点滴120分	day1,2,3

【非小細胞肺がん】

ジェムザール+ロゼウス①（非小細胞肺がん 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m2		30分 点滴静注	day1,8,15
ロゼウス	20 mg/m2		側管より点滴静注（10分以内）	day1,8,15

ジェムザール+ロゼウス②（非小細胞肺がん：1コース 28日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m2		30分 点滴静注	day1,8,15
ロゼウス	20 mg/m2		側管より点滴静注（10分以内）	day1,8,15

カルボプラチン+パクリタキセル（非小細胞肺がん 1コース：28日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
パクリタキセル	70 mg/m2		点滴静注 1時間	day1,8,15
カルボプラチン	AUC5		点滴静注 1時間	day1

キイトルーダ（非小細胞肺がん 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200 mg/body		30分かけて点滴静注	day1

ドセタキセル（非小細胞肺がん 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ドセタキセル	60 mg/m2		点滴静注 90分	day1

アリムタ（非小細胞肺がん 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
アリムタ	500 mg/m2		DIV	day1（3週間毎）

ロゼウス①（非小細胞肺がん 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ロゼウス	25 mg/m2		点滴静注 10分以内	day1、8

ロゼウス②（非小細胞肺がん 1コース：28日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ロゼウス	25 mg/m2		点滴静注 10分以内	day1、8、15

Biweeklyカルボプラチン+ドセタキセル（非小細胞肺がん 1コース：28日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ドセタキセル	30 mg/m2		30分 点滴静注	day1,15
カルボプラチン	AUC3		30分 点滴静注	day1,15

オブジーボ（非小細胞肺がん 1コース：14日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
オブジーボ	240 mg/body		点滴静注 30分以上かけて	day1

カルボプラチン+アリムタ（非小細胞肺がん 1コース21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
アリムタ	500 mg/m2		10分 点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC5		1時間 点滴静注	day1

ジェムザール（非小細胞肺がん 1コース：28日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m2		点滴静注 30分	day1、8、15

サイラムザ+ドセタキセル（非小細胞肺がん 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
サイラムザ（RAM）	10 mg/kg		点滴静注 1時間	day1
ドセタキセル（DOC）	60 mg/m2		点滴静注 1時間	day1

Biweeklyカルボプラチン+ジェムザール（非小細胞肺癌 1コース：28日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m ²		30分 点滴静注	day1,15
カルボプラチン	AUC3		30分 点滴静注	day1,15

テセントリク+アバスタチン+PTX+CBDCA（非小細胞肺癌 1コース：21日）4～6コース後終了後、増悪認めなければテセントリク+アバスタチンを投与

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
テセントリク	1200 mg/body		30～60分 点滴静注	day1
アバスタチン	15 mg/kg		30～90分 点滴静注	day1
パクリタキセル	200 mg/m ²		180分 点滴静注	day1
カルボプラチン	6 AUC		30分 点滴静注	day1

テセントリク+アリムタ+CBDCA（非小細胞肺癌 1コース：21日）4～6コース後終了後、増悪認めなければテセントリク+アリムタを投与

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
テセントリク	1200 mg/body		30～60分 点滴静注	day1
アリムタ	500 mg/m ²		10分 点滴静注	day1
カルボプラチン	6 AUC		60分 点滴静注	day1

テセントリク+アリムタ+CDDP（非小細胞肺癌 1コース：21日）4～6コース後終了後、増悪認めなければテセントリク+アリムタを投与

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
テセントリク	1200 mg/body		30～60分 点滴静注	day1
アリムタ	500 mg/m ²		10分 点滴静注	day1
シスプラチン	75 mg/m ²		60分 点滴静注	day1

オブジーボ+ヤーボイ（非小細胞肺癌 1コース：42日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
オブジーボ	240 mg/body		30分以上かけて 点滴静注	d1,15,29
ヤーボイ	1 mg/kg		30分 点滴静注	d1

テセントリク（非小細胞肺癌 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
テセントリク	1200 mg/body		30～60分 点滴静注	day1

アブラキサン+カルボプラチン（非小細胞肺癌 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
アブラキサン	100 mg/m ²		30分 点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		60分 点滴静注	day1

キイトルーダ+CBDCA+PEM（非小細胞肺癌 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200 mg/m ²		30分 点滴静注	day1
アリムタ	500 mg/m ²		10分 点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC5		60分 点滴静注	day1

キイトルーダ+CDDP+PEM（非小細胞肺癌 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200 mg/m ²		30分 点滴静注	day1
アリムタ	500 mg/m ²		10分 点滴静注	day1
シスプラチン	75 mg/m ²		60分 点滴静注	day1

キイトルーダ+CBDCA+PTX（非小細胞肺癌 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200 mg/body		30分 点滴静注	day1
パクリタキセル	200 mg/m ²		3時間 点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		60分 点滴静注	day1

キイトルーダ+CBDCA+nab-PTX（非小細胞肺癌 1コース：21日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
キイトルーダ	200 mg/body		30分 点滴静注	day1
アブラキサン	100 mg/m ²		30分 点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		60分 点滴静注	day1

サイラムザ+タルセバ（非小細胞肺癌 1コース：14日）

抗がん薬	投与量		投与方法	投与日
サイラムザ	10 mg/kg		30～60分 点滴静注	day1
タルセバ	150 mg/day		内服 1日1回	連日