

ベージニオ錠により下痢が起こることがあります。

定期的に服用するお薬：ミヤBM細粒 1回 包、1日 3回 朝・昼・夕食後



整腸剤です。毎食後、定期的に服用します。
下痢が起こる前から予防的に服用を続けましょう。

下痢が起こったときに服用するお薬：ロペミンカプセル 1mg



下痢を止める作用があります。下痢が起こったら、1カプセル服用してください。続けて服用する場合は、4時間間隔を空けてください。

下痢のコントロール目標は、「やや軟らかい便」です。

ベージニオを服用して、**下痢（泥状便・水様便）**が起きた場合

我慢せずに、ロペミンを1カプセル服用してください

- 下痢が治まらない時は1回2カプセルに増量可能です
- 泥状や水様の下痢が続くときは、4時間あければ追加服用可能です
- 1日6回まで服用しても下痢が治まらないときやきついときは病院にご連絡ください

* 便が出にくい時は、ご自身でロペミンの量の調節や中止をしてください。

下痢の状態に合わせたロペミンの使い方（参考）

- 「**下痢はあまり気にならない場合**」：下痢で不快だと感じる時には、ロペミン1カプセルを服用してください。
- 「**外出時に下痢が起こらないか不安な場合**」：いつでも服用できるようにロペミンを携帯してください。
(例) 外出する前にロペミン1カプセルを服用する。
- 「**決まった時間に下痢が起こる場合**」：(例) いつも午前中に下痢が起こる場合。
朝食後にロペミン1カプセルを服用する。

以下のような症状がある場合、病院に連絡をして下さい

- ロペミンを飲んでも、（水っぽい）下痢がいつもよりも6回以上続く
- 激しい腹痛
- 発熱・嘔吐
- 飲食が出来ない
- 血便・黒色便
- めまい
- だるさが強い

医療機関名	聖隷横浜病院
診療科名	乳腺外科
電話番号	045-715-3111(代表)

非常に遅い (約100時間)	1	コロコロ便		硬くてコロコロの 塊糞状の便
↑ 消化管の 通過時間 ↓	2	硬い便		ソーセージ状であるが 硬い便
	3	やや硬い便		表面にひび割れのある ソーセージ状の便
	4	普通便		表面がなめらかで柔らかい ソーセージ状、あるいは 蛇のようなとぐろを巻く便
	5	やや軟らかい便		はっきりとしたしわのある 柔らかい半分圓形の便
	6	泥状便		境界がほぐれて、ふいふい にやの不定形の小片便 泥状の便
	7	水様便		水様で、固形物を含まない 液体状の便
	非常に早い (約10時間)			

参照：排泄ナビ

聖隷横浜病院 薬剤部