

【胃がん】

胃 DS (1~7コース: 21日/1コース、8コース以降: 42日/1コース)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
TS-1 (1コース)	-	内服	day1-day14
ドセタキセル (2~7コース)	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1
TS-1 (2~7コース)	-	内服	day1-day14
TS-1 (8コース以降)	-	内服	day1-day28

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

胃 Weeklyパクリタキセル (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d 1,8,15

胃 サイラムザ (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注 60分	day1

胃 サイラムザ+パクリタキセル (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d 1,15
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d 1,8,15

胃 SOX (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ティーエスワンOD錠	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝夕食後	day1夕-day15朝
エルプラット	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

胃 XELOX (1コース: 21日) 術後補助療法は8コースまで

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
エルプラット	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
ゼローダ	下記参照	1日2回 内服	d1 PM-d15 AM

\*ゼローダ 体表面積1.36㎡未満: 1回1200mg、1.36~1.66㎡未満: 1回1500mg、1.66-1.96㎡未満: 1回1800mg、1.96㎡以上: 1回2100mg

胃 オブジーボ (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ	240 mg/body	点滴静注 30分以上かけて	day1

胃 オブジーボ (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ	480 mg/body	点滴静注 30分以上かけて	day1

胃 トラスツスマブ+SOX (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ティーエスワンOD錠	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝夕食後	day1夕-day15朝
エルプラット	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
トラスツスマブ (初回)	8 mg/kg	点滴静注 初回90分	day1
トラスツスマブ (2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 2回目以降30分	day1

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

胃 サイラムザ+アブラキサン (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d 1,15
アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d 1,8,15

胃 オブジーボ+SOX (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ティーエスワンOD錠	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝夕食後	day1夕-day15朝
エルプラット	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
オブジーボ	360 mg/body	点滴静注 30分	day1

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

胃 エンハーツ (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
エンハーツ	6.4 mg/kg	点滴静注 30~90分	day1

### 【肝臓がん】

肝臓 テセントリク+アバスチン(1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
テセントリク	1200 mg/body	点滴静注 30~60分	d1
アバスチン	15 mg/kg	点滴静注 30~90分	d1

### 【胆道がん】

胆道 CDDP+GEM (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1, d8
シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1, d8

胆道 GEM (1コース：28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8,15

胆道 イミフィンジ+CDDP+GEM (1コース：21日) 最大8コース

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注 1時間	d1
ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1, d8
シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1, d8

胆道 イミフィンジ (1コース：28日) ※イミフィンジ+CDDP+GEM終了後開始

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注 1時間	d1

### 【膵がん】

膵 GEM (1コース：28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8,15

膵 膵癌TS-1+GEM (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
TS-1	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝夕食後	d1-14
ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d8, 15

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満：60mg/日(朝40mg 夕20mg)、1.25~1.5㎡未満：80mg/日、1.5㎡以上：100mg/日

膵 オニバイド+FF (1コース：14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
オニバイド	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-3

膵 GEM+nab-PTX (1コース：28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8,15
アブラキサン	125 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8,15

膵 FOLFIRINOX (1コース：14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
エルプラット	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
カンプト	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分間	day1
5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-3

膵 膵癌術前TS-1+GEM (1コース：21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
TS-1	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝夕食後	d1-14
ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満：80mg/日、1.25~1.5㎡未満：100mg/日、1.5㎡以上：120mg/日

### 【大腸がん】

大腸 mFOLFOX6±アバスチン (1コース：14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスチン	5 mg/kg	点滴静注 90~30分	day1
エルプラット	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1
5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1

大腸 FOLFIRI±アバスタチン (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスタチン	5 mg/kg	点滴静注 90分~30分	day1
カンプト	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1
5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1

大腸 アバスタチン+FOLFOXIRI (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスタチン	5 mg/kg	点滴静注 90分~30分	day1
カンプト	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	day1 (12コースまで)
エルプラット	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1 (12コースまで)
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1

大腸 アバスタチン+IRIS (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスタチン	5 mg/kg	点滴静注 90分~30分	day1.15
カンプト	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1.15
TS-1	別表参照	1日2回 朝夕食後内服	day1夕-day15朝

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

大腸 IRIS (1コース: 28日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
カンプト	125 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1.15
TS-1	別表参照	1日2回 朝夕食後内服	day1夕-day15朝

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

大腸 アバスタチン+SOX (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ティーエスワンOD錠	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝夕食後	day1夕-day15朝
アバスタチン	7.5 mg/kg	点滴静注 90分~30分	day1
エルプラット	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

大腸 バクテピックス (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
バクテピックス	6 mg/kg	点滴静注 1時間	day1

大腸 バクテピックス+mFOLFOX6 (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
バクテピックス	6 mg/kg	点滴静注 1時間	day1
エルプラット	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分間	day1
5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1

大腸 バクテピックス+FOLFIRI (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
バクテピックス	6 mg/kg	点滴静注 1時間	day1
カンプト	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分間	day1
5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1

大腸 サイラムザ+FOLFIRI (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
サイラムザ (RAM)	8 mg/kg	点滴静注 1時間	day1
カンプト	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1
5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1

大腸 SIRB (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスタチン	7.5 mg/kg	点滴静注 90分~30分	day1
カンプト	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1
TS-1	別表参照	1日2回 朝夕食後内服	day1夕-day15朝

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

大腸 SOX (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ティーエスワンOD錠	下記参照 mg/回	内服 1日2回朝夕食後	day1夕-day15朝
エルプラット	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1

\*TS-1 体表面積1.25㎡未満: 80mg/日、1.25~1.5未満: 100mg/日、1.5㎡以上: 120mg/日

大腸 XELOX+アバスチン (1コース: 21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスチン	7.5 mg/kg	点滴静注 90~30分	day1
エルプラット	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
ゼローダ	下記参照	1日2回 内服	d1 PM-d15 AM

\* $\text{t}^0$ - $\text{t}^2$  体表面積1.36m<sup>2</sup>未満: 1回1200mg、1.36~1.66m<sup>2</sup>未満: 1回1500mg、1.66-1.96m<sup>2</sup>未満: 1回1800mg、1.96m<sup>2</sup>以上: 1回2100mg

大腸 XELOX (1コース: 21日) 術後補助療法は8コースまたは3コースまで

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
エルプラット	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
ゼローダ	下記参照	1日2回 内服	d1 PM-d15 AM

\* $\text{t}^0$ - $\text{t}^2$  体表面積1.36m<sup>2</sup>未満: 1回1200mg、1.36~1.66m<sup>2</sup>未満: 1回1500mg、1.66-1.96m<sup>2</sup>未満: 1回1800mg、1.96m<sup>2</sup>以上: 1回2100mg

大腸 カンプト+ベクティビックス (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
カンプト	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1
ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注 1時間	day1

大腸 ギルトラップ+FOLFIRI (1コース: 14日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
ギルトラップ	4 mg/kg	点滴静注 1時間	day1
カンプト	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1
5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分間	day1
5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1

大腸 XELIRI+アバスチン(1コース:21日)

抗がん薬	投与量	投与方法	投与日
アバスチン	7.5 mg/kg	点滴静注 30~90分	day1
カンプト	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1
ゼローダ	下記参照	1日2回 内服	d1 PM-d15 AM

\* $\text{t}^0$ - $\text{t}^2$  体表面積1.31m<sup>2</sup>未満: 1回900mg、1.31~1.69m<sup>2</sup>未満: 1回1200mg、1.69-2.07m<sup>2</sup>未満: 1回1500mg、2.07m<sup>2</sup>以上: 1回1800mg